



TECHNICKÝ LIST

Rozchodníkové sazenice

Popis produktu

Předpěstované rozchodníkové sazenice v sadbovačích představují vysoce efektivní a ekonomicky dostupnou volbu pro zakládání extenzivních zelených střech, regeneraci stávajících porostů nebo opravy vegetačních rohoží. Díky přirozené odolnosti vůči suchu, mrazu a teplotním extrémům vyžaduje výsledný porost po zapojení minimální údržbu. Sazenice jsou dodávány v pěstebních platech zpravidla po 100 ks.

Druhy rozchodníků

Produkt obsahuje vyvážený mix extenzivních druhů rozchodníků, které zajišťují celoroční estetickou variabilitu a vysokou regenerační schopnost.

- *Sedum album* (Rozchodník bílý)
- *Sedum kamtschaticum* (Rozchodník kamčatský)
- *Sedum spurium* (Rozchodník pochybný)
- *Sedum reflexum* (Rozchodník skalní)
- *Sedum sexangulare* (Rozchodník šestiřadý)
- *Sedum floriferum* (Rozchodník květonosný)

Podmínky pro realizaci

- Optimální termín: Výsadbou doporučujeme realizovat v agrotechnických lhůtách na jaře nebo na podzim.
- Omezení: Aplikace se nedoporučuje v obdobích dlouhotrvajících vysokých letních teplot, kdy hrozí riziko zaschnutí řízků před zakořeněním. Platí také pro období nízkých teplot.

Instalace

Před samotnou výsadbou doporučujeme nechat sadbovače 1-2 bez zálivky. Sušší kořenový bal se ze sadbovače vyjímá výrazně snáze a bez poškození než bal přemokřený. Výsadbou lze realizovat v průběhu celé vegetační sezóny, optimálně od dubna do října. Rychlost plného zapojení porostu je přímo závislá na zvolené hustotě výsadby.

TECHNICKÝ LIST

- Hustota nové výsadby: Minimální množství 25 ks/m². V tomto rozsahu je doporučený spon 20x20 cm. Plně srostlé střechy docílíme za 2-3 vegetační období.
- Opravy vegetačních koberců: Sazenice jsou ideální pro lokální sanaci poškozených míst v rozchodníkových rohožích. Aplikace se provádí prostřížením původní rohože a vložením sazenice s kořenovým balem přímo do stávajícího střešního substrátu.
- Závlaha: Pro úspěšné zakořenění a eliminaci mortality rostlin je nutné striktně dodržet následující závlahový plán. Ihned po výsadbě ideálně 10 l/m². Následná zálivka (prvních 30 dní) 5 litrů/m². V období extrémních teplot a deficitu srážek je nezbytné intenzitu zálivky navýšit. Při zanedbání závlahy v letních měsících hrozí stagnace růstu nebo trvalé zaschnuté vegetace.

Balení, přeprava a druhová skladba

Dbáme na čerstvost materiálu, proto logistiku přizpůsobujeme objemu zakázky tak, aby byly sazenice doručeny v optimální kondici pro okamžitou výsadbu.

- Osobní odběr: Chironova 570, Brno-Bosonohy 642 00 nebo Bořetice 89, 691 08 Bořetice
- Balíková přeprava: Zásilky do celkové hmotnosti 25 kg expedujeme prostřednictvím standartní balíkové kurýrní služby. Sazenice jsou dodávány v sadbovačích. Standartní balení jsou 3 sadbovače po 100 ks.
- Paletová a nadrozměrný přeprava: Větší objemy zakázek jsou z důvodu zachování kvality rostlinného materiálu distribuovány ve více samostatných balících nebo na paletách prostřednictvím specializované cargo dopravy.

